



## Opalescence PF 16% Mint/Melon/Regular-Neutral Ultradent

**Състав:** Carbamide Peroxide with Potassium Nitrate and Fluoride

### Общи насоки и мерки за безопасност:

1. Съхранявайте избелващият продукт на недостъпно за малки деца място.
2. Някои оцветявания могат да се нуждаят от стоматологично лечение различно от избелване. Керамични корони, фасети и бели пломби не се повлияват от избелване.
3. Желателно е да се ползва от пациенти със здрава венечна тъкан. Може да настъпи раздразнение на венеца, ако се ползва от пациенти с периодонтални заболявания.
4. Този продукт може да се употребява през деня и през нощта.
5. Понякога, някои зъби могат да се избелят по-бързо или по-бавно от другите. Резултатите могат да са различни. В приблизително 5% от случаите може да се появи съпротивление на избелването. Избелването на зъби с голямо количество метален пълнеж може да причини появата на цвета на метала през зъбите.
6. Киселинни храни/сокове могат да причинят чувствителност, ако се консумират скоро след избелване.
7. Пигментирани храни и напитки, както и тютюн, могат скоро след процедурата по избелване, да оцветят зъбите.
8. Зъбите са естествено по-тъмни около края на венеца. Тези места могат да изискват повече време, за да се изсветлят, отколкото останалата зъбна повърхност и обикновено остават малко потъмни.
9. Малка част от пациентите изпитват чувствителност при избелване. Калиевият нитрат в Opalescence PF трябва да предотврати това. Ако чувствителност се появи и продължи, обърнете се към стоматолога си. Може да ви бъде препоръчано да избелвате зъбите си всяка втора или трета нощ, да използвате Opalescence PF през деня за 1 до 3 часа, или да използвате флуориден или реминерализиращ гел в шината.
10. Храни и сокове с високо съдържание на лимонена или фосфорна киселина биха могли да предизвикат чувствителност на зъбите.
11. Не пушете и не яжте по време на избелване.
12. Не е желателно избелване по време на бременност.
13. Съхранявайте далеч от топлина и пряка слънчева светлина. Не замразявайте продукта.
14. Остатъчните количества гел се изхвърлят

### Предупреждение:

Някои пациенти могат да получат чувствителност. Ако това се случи, доста често чувството е леко и краткотрайно, но в някои случаи може да се наложи лечение от Вашия стоматолог. Ако почувствате значителен дискомфорт, спрете да използвате продукта и се консултирайте с Вашия стоматолог. Ако имате някакви въпроси за този продукт или лечение, моля обърнете се към Вашия стоматолог.

**Opalescence PF 10% Mint/Melon/Regular-Neutral** - За използване с индивидуализирани шини за избелване в домашни условия. Гелът съдържа 20% вода за предотвратяване на дехидратацията, а лепкавостта и вискозитета му спомогат за задържането на шината и гела на място, при поставяне. Пет концентрации и три вкуса, според индивидуалните нужди на пациентите.

**Гелът за избелване на зъбите Opalescence съдържа PF** (калиев нитрат и флуорид)

Формулиран за предотвратяване на дехидратация и рецидив на сянка

Пет концентрации

Три вкуса: Mint, Melon и Regular

Употреба: дневна и нощна

Лепливият, вискозен гел не мигрира към меките тъкани и е гарант, че шината остава на място

Без животински продукти - Vegan

Сертифициран без-глутенов продукт

Балансирано PH

## Процедури

### Opalescence PF Whitening Инструкции за пациента

1. Измийте зъбите си с паста за зъби Opalescence
2. Следвайте стъпките:

Стъпка 1



Нанесете равномерно количество гел от молар до молар, като за това трябва да използвате около 1/2 до 1/3 от спринцовката за една шина.

Стъпка 2



Поставете шината в устата си и леко я почукайте, за да адаптирате страните ѝ към зъбите си. Времето за престой зависи от това коя концентрация на избелващо средство Opalescence използвате.

Стъпка 3



Отстранете излишното количество гел с мека четка за зъби. Внимателно изплакнете устата си с вода, като внимавате да не преглътнете.

Стъпка 4



Почистете шината с мека четка зъби и с вода /макс.36°C/. Съхранявайте шината в предоставената за целта кутийка.

- Opalescence PF 16%: 4–6 часа

Ако по време на процедурите се появи чувствителност, която продължи или се засили, спрете лечението и се консултирайте с вашия зъболекар.

Ако временния дискомфорт на венците, устните, гърлото или езика продължи повече от два дни или се влоши прогресивно, се обърнете към вашия стоматолог. Обикновено, тези странични ефекти намаляват в рамките на от един до три дни след провеждане на процедурата.

**Условия за съхранение:**

Да се съхранява на непряка слънчева светлина.

Да се съхранява при ниска температура (в хладилник), ако не се употребява ежедневно. Да не се допуска замръзване!

**Да се съхранява на място недостъпно за деца.**

**Срок на годност:** 12 месеца

Датата на изтичане на срока на годност е посочена на опаковката.

**Дистрибутор в България:** Дентстор България ЕООД

ул. Позитано 2, сграда Perform Business Center, гр. София, България

**Тел./Факс:** + 359 02 4930166

**E-mail:** orders@dentstore.bg

**Сайт:** <https://dentstore.bg/>